

## Clase 19

Recordemos, antes de iniciar esta clase, algunos resultados que ocuparemos en esta sesión:

**Observación 1** *Se satisfacen las siguientes afirmaciones:*

- (1)  $\ln(1) = 0$ .
- (2) Si  $1 < x$ , entonces  $\ln(x) > 0$ .
- (3) Si  $0 < x < 1$ , entonces  $\ln(x) < 0$ .
- (4) Por el Primer Teorema Fundamental del Cálculo,  $\ln$  es derivable en  $(0, \infty)$  y  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$  para cada  $x \in \mathbb{R}^+$ . De aquí que  $\ln$  sea creciente en su dominio.

**Teorema 2** *Para cualesquiera  $x, y \in \mathbb{R}^+$  se satisface que*

$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y).$$

En esta ocasión introduciremos la función exponencial.

## La Función Exponencial

Como vimos en la Observación 1, logaritmo natural es una función creciente en su dominio, por lo que resulta una función inyectiva en su dominio, así que podemos considerar la función inversa del logaritmo natural.

**Definición 3** *Definimos la función **exponencial**, denotada por  $\exp$  como la función  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por*

$$\exp(x) = \ln^{-1}(x).$$

Note que  $\exp(x) \in (0, \infty)$ , para cualquier  $x \in \mathbb{R}$ , pues  $(0, \infty)$  es el dominio de la función  $\ln$ . Con esta observación podríamos darnos una idea de cómo es la gráfica de  $\exp$ , pero esperaremos a demostrar más propiedades de la función  $\exp$ .

**Teorema 4** *Para cualquier  $x \in \mathbb{R}$  se cumple que*

$$\exp'(x) = \exp(x).$$

**Demostración.** Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Por el Teorema de la Función Inversa, tenemos que

$$\begin{aligned} \exp'(x) &= (\ln^{-1})'(x) \\ &= \frac{1}{\ln'(\ln^{-1}(x))} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{1}{\ln^{-1}(x)}\right)} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{1}{\exp(x)}\right)} \\ &= \exp(x). \end{aligned}$$

■

Note entonces que  $\exp$  es una función creciente, pues  $\exp'(x) = \exp(x) > 0$ .

**Teorema 5** Para cualesquiera  $x, y \in \mathbb{R}$  se satisface que

$$\exp(x + y) = \exp(x) \cdot \exp(y).$$

**Demostración.** Sean  $x, y, u, v \in \mathbb{R}$  tales que  $u = \exp(x)$  y  $v = \exp(y)$ . Entonces, se tiene que

$$\ln(u) = x \quad \text{y} \quad \ln(v) = y.$$

Luego, por el Teorema 2,

$$x + y = \ln(u) + \ln(v) = \ln(uv)$$

y de aquí que

$$\exp(x + y) = uv = \exp(x) \cdot \exp(y).$$

■

¿Recuerda la motivación con la que iniciamos este capítulo? Queremos hallar una función  $f$  que cumpla la ecuación

$$f(x + y) = f(x) \cdot f(y), \tag{1}$$

y una de las cosas importantes era el valor que tomaba dicha función en 1, pues al menos para cualquier racional  $r$  se debía cumplir que

$$f(r) = (f(1))^r. \tag{2}$$

**Definición 6** Definimos el número  $e$  como

$$e = \exp(1).$$

**Proposición 7** Se tiene que

$$2 < e < 4.$$

**Demostración.** Note que la desigualdad que debemos demostrar es equivalente a

$$\ln(2) < \ln(e) < \ln(4) \tag{3}$$

(¿por qué?). Por lo que demostraremos (3). Para ello, consideremos las particiones  $P = \{1, 2\} \in \mathcal{P}_{[1,2]}$  y  $Q = \{1, 2, 4\} \in \mathcal{P}_{[1,4]}$ . Se tiene que

$$\int_1^2 \frac{1}{t} dt < \overline{S}\left(\frac{1}{t}, P\right) = 1 \cdot (2 - 1) = 1$$

y

$$1 = \frac{1}{2} \cdot (2 - 1) + \frac{1}{4} \cdot (4 - 2) = \underline{S}\left(\frac{1}{t}, Q\right) < \int_1^4 \frac{1}{t} dt.$$

Finalmente, como  $\ln(e) = \ln(\exp(1)) = 1$ , tenemos que

$$\int_1^2 \frac{1}{t} dt < \ln(e) < \int_1^4 \frac{1}{t} dt,$$

es decir,

$$\ln(2) < \ln(e) < \ln(4).$$

■

Note que esta proposición nos proporciona unas primeras cotas para el número  $e$ , más tarde podremos mejorar estas cotas.

Ahora, recordando que la función  $\exp$  satisface la ecuación (1) y que para cualquier racional  $r$  se cumple la ecuación (2), damos la siguiente definición.

**Definición 8** *Para cualquier número  $x \in \mathbb{R}$  definimos  $e^x$  como*

$$e^x = \exp(x).$$

Note que hemos logrado definir exponentes de cualquier tipo (¡incluso irracionales!) aunque, por el momento, solo para una base, para el número  $e$ . Uno de nuestros propósitos.