Clase 42

Proposición 1 Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $\bar{x}_0 \in U$ y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función tales que $f \in C^2(U)$ y $\bar{x}_0$ es un punto crítico de f . Se tiene que:

- (a) Si la hessiana de f en $\bar{x}_0$ es una forma cuadrática semipositiva y no degenerada, entonces f tiene un mínimo local en $\bar{x}_0$.
- (b) Si la hessiana de f en $\bar{x}_0$ es una forma cuadrática seminegativa y no degenerada, entonces f tiene un máximo local en $\bar{x}_0$.

Máximos y Mínimos (2da. Parte)

Proposición 2 Sea $Q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la forma cuadrática que tiene asociada la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix},$$

es decir, la forma cuadrática dada por

$$\begin{aligned} Q(x, y) &= [x \ y] A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= [x \ y] \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= ax^2 + 2bxy + cy^2. \end{aligned}$$

Entonces, Q es semipositiva (resp. seminegativa) y no degenerada si y sólo si $a > 0$ (resp. $a < 0$) y $\det(A) = ac - b^2 > 0$.

Demostración. En primer lugar, supongamos que Q es seminegativa y no degenerada, esto es, que $Q(\bar{x}) \leq 0$ para todo $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ y $Q(\bar{x}) = 0$ si y sólo si $\bar{x} = \bar{0}$. Así, $a = Q(1, 0) < 0$, es decir, $a < 0$. Ahora, note que

$$\begin{aligned} Q(x, y) &= ax^2 + 2bxy + cy^2 \\ &= a \left(x + \frac{b}{a}y \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a} \right) y^2 \\ &= a \left(x + \frac{b}{a}y \right)^2 + \left(\frac{ac - b^2}{a} \right) y^2. \end{aligned}$$

De donde,

$$\frac{ac - b^2}{a} = Q(b/a, -1) < 0.$$

Y como $a < 0$ concluimos que $\det(A) = ac - b^2 > 0$, lo que demuestra la primera implicación.

Supongamos ahora que $a < 0$ y que $\det(A) = ac - b^2 > 0$. Como

$$Q(x, y) = a \left(x + \frac{b}{a}y \right)^2 + \left(\frac{ac - b^2}{a} \right) y^2$$

entonces Q es seminegativa. Luego, si (x, y) es tal que $Q(x, y) = 0$, entonces debe ocurrir que

$$a \left(x + \frac{b}{a}y \right)^2 = 0 \quad \text{y} \quad \left(\frac{ac - b^2}{a} \right) y^2 = 0$$

De la segunda ecuación obtenemos que $y = 0$ y sustituyendo en la primera obtenemos que $x = 0$. Así, Q es no degenerada. ■

Como consecuencia de esta proposición tenemos un corolario de la Proposición 1.

Corolario 3 Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $\bar{x}_0 \in U$ y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función tales que $f \in C^2(U)$ y $\bar{x}_0$ es un punto crítico de f . Se tiene que:

(a) Si

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\bar{x}_0) > 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\bar{x}_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\bar{x}_0) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\bar{x}_0) \right)^2 > 0,$$

entonces f tiene un mínimo local en $\bar{x}_0$.

(b) Si

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\bar{x}_0) < 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\bar{x}_0) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\bar{x}_0) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\bar{x}_0) \right)^2 > 0,$$

entonces f tiene un máximo local en $\bar{x}_0$.

Veamos ahora un par de ejemplos donde utilizaremos el corolario anterior y donde seguiremos un proceso similar al que utilizábamos para hallar máximos y mínimos de una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, derivable en (a, b) y continua en $[a, b]$, es decir, hallábamos los puntos críticos de f en (a, b) , determinábamos si se trataban de máximos o mínimos locales o ninguno de los dos y finalmente los comparábamos con los valores en los extremos de $[a, b]$.

Ejemplo 4 Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = (x + 1)^2 + y^2$$

y el conjunto $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| \leq 2\}$. Halle los valores máximo y mínimo de f sobre B .

Solución. Primero note que la función f es continua sobre todo $\mathbb{R}^2$, en particular sobre el conjunto cerrado y acotado (compacto) B , así que f sí alcanza su valor máximo y su valor mínimo sobre B . Para hallar dichos valores procederemos de la siguiente manera, hallaremos primero los puntos críticos de f en el abierto $\text{int}(B)$, veremos si son máximos o mínimos locales o ninguno de estos,

después hallaremos los valores máximo y mínimo de f sobre el conjunto cerrado $Fr(B)$ y comparemos con los obtenidos en $int(B)$.

Para hallar los puntos críticos de f en $int(B)$ debemos hallar los puntos $(x, y) \in int(B)$ tales que $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$. Pero

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2(x + 1) \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y,$$

entonces debemos hallar los puntos $(x, y) \in int(B)$ tales que

$$2(x + 1) = 0 \quad \text{y} \quad 2y = 0.$$

Lo que ocurre únicamente si $x = -1$ y $y = 0$, es decir, el único punto crítico de f en todo $\mathbb{R}^2$ es el punto $(-1, 0)$ que de hecho pertenece al interior de B , pues $\|(-1, 0)\| = 1 \leq 2$. Ahora, note que

$$f(-1, 0) = 0 \leq (x + 1)^2 + y^2 = f(x, y)$$

para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, por lo que f tiene un mínimo en $(-1, 0)$ sobre todo $\mathbb{R}^2$. Así, f alcanza su valor mínimo sobre B en el punto $(-1, 0)$ y dicho valor es 0.

Ahora, observe que

$$Fr(B) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| = 2\}$$

y que la función $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por

$$\gamma(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t)),$$

es tal que $\gamma([0, 2\pi]) = Fr(B)$, es decir, γ es una parametrización de $Fr(B)$. Luego, si definimos la función $g : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ como $g(t) = (f \circ \gamma)(t)$ y localizamos sus valores máximo y mínimo en su dominio obtendremos los valores máximo y mínimo de f sobre $Fr(B)$.

Se tiene que

$$g(t) = (f \circ \gamma)(t) = f(\gamma(t)) = f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) = (2 \cos(t) + 1)^2 + 4 \sin^2(t) = 4 \cos(t) + 5.$$

De donde, $g'(t) = 0$ si y sólo si $-4 \sin(t) = 0$, lo cual ocurre solo si $t = \pi$. Como $g(\pi) = 1 \leq 4 \cos(t) + 5 = g(t)$ para toda $t \in [0, 2\pi]$, se tiene que g alcanza su valor mínimo en $t = \pi$ y dicho valor es 1.

Ahora, dado que $g(0) = 9$ y $g(2\pi) = 9$, entonces tenemos que g alcanza su valor máximo en $t = 0$ y $t = 2\pi$. Por lo tanto tenemos que f alcanza su valor mínimo sobre $Fr(B)$ en el punto $\gamma(\pi) = (-2, 0)$, dicho valor es $f(-2, 0) = 1$, y su valor máximo sobre $Fr(B)$ en el punto $\gamma(0) = \gamma(2\pi) = (2, 0)$ y dicho valor es $f(2, 0) = 9$.

Finalmente, comparando los valores obtenidos en $Int(B)$ y en $Fr(B)$, concluimos que f alcanza su valor mínimo sobre B en el punto $(-1, 0)$, dicho valor es 0, y que f alcanza su valor máximo sobre B en el punto $(2, 0)$ y que dicho valor es 9 (vea figura 1). ■

Como seguramente ya lo notaron, en el ejemplo anterior no fue necesario utilizar el Corolario 3, entonces veamos un ejemplo donde sí utilicemos dicho corolario.

Figura 1: Los valores máximo y mínimo de $f(x, y) = (x+1)^2 + y^2$ sobre B son 9 y 0 respectivamente.

Ejemplo 5 Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2(x - y)$$

y el conjunto $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| \leq 2\}$. Halle los valores máximo y mínimo de f sobre B .

Solución. Es claro que f alcanza tanto su valor máximo como su valor mínimo sobre B pues f es continua y B es compacto. Igual que en el ejemplo anterior, determinemos primero los puntos críticos de f sobre $\text{int}(B)$, para ello note que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - 2 \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y + 2,$$

de donde $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$ si y sólo si

$$2x - 2 = 0 \quad \text{y} \quad 2y + 2 = 0,$$

lo que ocurre si y sólo si $(x, y) = (1, -1)$. Ahora,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 2,$$

de donde

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, -1) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, -1) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, -1) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, -1) = 2,$$

Así,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, -1) = 2 > 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, -1) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, -1) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, -1) \right)^2 = 4 > 0,$$

entonces, por el inciso (a) del Corolario 3, f tiene un mínimo local en $(1, -1)$ y dicho valor es $f(1, -1) = -2$.

Ahora, igual que en el ejemplo anterior, la función $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por

$$\gamma(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t))$$

parametriza $Fr(B)$. Así que al hallar el máximo y el mínimo de la función $g : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $g(t) = (f \circ \gamma)(t)$, obtendremos el máximo y el mínimo de f sobre $Fr(B)$.

Se tiene que

$$g(t) = (f \circ \gamma)(t) = f(\gamma(t)) = f(2 \cos(t), 2 \sin(t)) = 4 - 4(\cos(t) - \sin(t)).$$

De donde, $g'(t) = 0$ si y sólo si $4(\cos(t) + \sin(t)) = 0$, lo cual ocurre solo si $t = 3\pi/4$ o $t = 7\pi/4$. Luego $g''(t) = 4(\cos(t) - \sin(t))$ y de aquí que $g''(3\pi/4) < 0$ y $g''(7\pi/4) > 0$. con lo que g tiene un máximo local en $t = 3\pi/4$ y un mínimo local en $t = 7\pi/4$ y los valores son $g(3\pi/4) = 4 + 4\sqrt{2}$ y $g(7\pi/4) = 4 - 4\sqrt{2}$, respectivamente. Y como $g(0) = g(2\pi) = 0$, tenemos que el valor máximo de g es $4 + 4\sqrt{2}$, alcanzado en $t = 3\pi/4$, y el valor mínimo es $4 - 4\sqrt{2}$, alcanzado en $t = 7\pi/4$. Así, el valor máximo de f en $Fr(B)$ es $4 + 4\sqrt{2}$, alcanzado en $\gamma(3\pi/4) = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$, y el valor mínimo de f sobre $Fr(B)$ es $4 - 4\sqrt{2}$, alcanzado en $\gamma(7\pi/4) = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

Finalmente, comparando los valores obtenidos en $Int(B)$ y en $Fr(B)$, concluimos que f alcanza su valor mínimo sobre B en el punto $(1, -1)$, dicho valor es -2 , y que f alcanza su valor máximo sobre B en el punto $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ y que dicho valor es $4 + 4\sqrt{2}$. (vea figura 2). ■

Figura 2: Los valores máximo y mínimo de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2(x - y)$ sobre B son $4 + 4\sqrt{2}$ y -2 respectivamente.

Note que en los ejemplos anteriores solo pudimos utilizar la herramienta nueva en el conjunto abierto $int(B)$, el siguiente paso es desarrollar herramientas para hallar máximos y mínimos sobre conjuntos “flacos” justo como $Fr(B)$.

En los ejemplos anteriores, para hallar los máximos y mínimos de f sobre $Fr(B)$, usamos fuertemente el hecho de que $Fr(B) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\| = 2\}$ se puede parametrizar. Ahora usaremos otra propiedad de $Fr(B)$ para deducir otra forma hallar los máximos y mínimos de f sobre $Fr(B)$, esta propiedad es que $Fr(B)$ se puede pensar como un conjunto de nivel de alguna función. Es decir, si $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por $g(x, y) = x^2 + y^2$, entonces $N_4(g) = Fr(B)$. Así, nuestro problema sería hallar los máximos y mínimos de f sobre $N_4(g)$. Aprovecharemos, que para la función f y el conjunto B del Ejemplo 4 ya lo sabemos. Vimos que f alcanza su valor máximo y su valor mínimo sobre $Fr(B)$ en los puntos $(2, 0)$ y $(-2, 0)$ respectivamente y que dichos valores son 1 y 9 respectivamente. Consideremos ahora un par de conjuntos de nivel de f , pero no cualquiera, justo los conjuntos del nivel donde f alcanza sus valores extremos, a saber $N_1(f)$ y $N_9(f)$. Observe que estos conjuntos de nivel son tangentes como se muestra en la figura 3.

Figura 3: Los conjuntos $N_9(f)$ y $N_1(f)$ son tangentes a $N_4(g)$ en $(2, 0)$ y $(-2, 0)$, respectivamente.

Ahora, si recordamos que el vector gradiente de una función en un punto $\bar{x}_0$ es normal al conjunto de nivel que contiene dicho punto, según nuestra observación anterior (los conjuntos de nivel son tangentes) los vectores $\nabla f(-2, 0)$ y $\nabla g(-2, 0)$ deben ser paralelos al igual que los vectores $\nabla f(2, 0)$ y $\nabla g(2, 0)$. Veamos si efectivamente esto ocurre.

Se tiene que

$$\nabla f(x, y) = (2(x + 1), 2y) \quad \text{y} \quad \nabla g(x, y) = (2x, 2y)$$

para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, así que

$$\nabla f(2, 0) = (6, 0) \quad \text{y} \quad \nabla g(2, 0) = (4, 0)$$

y

$$\nabla f(-2, 0) = (-2, 0) \quad \text{y} \quad \nabla g(-2, 0) = (-4, 0).$$

Por lo tanto

$$\nabla f(2, 0) = \frac{3}{2} \nabla g(2, 0) \quad \text{y} \quad \nabla f(-2, 0) = \frac{1}{2} \nabla g(-2, 0).$$

Ah, entonces si queremos hallar los valores máximo y mínimo de una función f sobre un conjunto de nivel de otra función, digamos $N_c(g)$ ¿es suficiente con encontrar los puntos $\bar{x} \in N_c(g)$ en los cuales $\nabla f(\bar{x})$ y $\nabla g(\bar{x})$ son paralelos? Veamos si esto es cierto con un problema geométrico bien conocido: Dado un plano $P \subseteq \mathbb{R}^3$ que tiene como ecuación

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

con A, B, C no todos cero, y un punto $\bar{x}_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$. Halle la distancia del punto $\bar{x}_0$ al plano P .

Dicha distancia es la mínima distancia entre el punto $\bar{x}_0$ y los puntos del plano P y como el punto en el plano que minimiza la distancia a $\bar{x}_0$ es el mismo que minimiza la distancia al cuadrado, entonces trabajaremos con la función $f(x, y, z) = d^2(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$. Así que debemos hallar el valor mínimo de la función f sobre el conjunto $N_0(g)$ donde g está dada por $g(x, y, z) = Ax + By + Cz + D$. Se tiene que

$$\nabla f(x, y, z) = (2(x - x_0), 2(y - y_0), 2(z - z_0)) \quad \text{y} \quad \nabla g(x, y, z) = (A, B, C).$$

Y como debemos hallar los puntos $(x, y, z) \in N_c(g)$ tales que $\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z)$ para $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces debemos resolver el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 2(x - x_0) &= \lambda A \\ 2(y - y_0) &= \lambda B \\ 2(z - z_0) &= \lambda C \\ Ax + By + Cz + D &= 0. \end{aligned}$$

De las primeras tres ecuaciones tenemos que

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2}\lambda A + x_0 \\ y &= \frac{1}{2}\lambda B + y_0 \\ z &= \frac{1}{2}\lambda C + z_0 \end{aligned}$$

y sustituyendo esto en la cuarta ecuación tenemos que

$$A \left(\frac{1}{2}\lambda A + x_0 \right) + B \left(\frac{1}{2}\lambda B + y_0 \right) + C \left(\frac{1}{2}\lambda C + z_0 \right) + D = 0.$$

De donde

$$\lambda = -\frac{2(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)}{A^2 + B^2 + C^2}. \quad (1)$$

Y sustituyendo este valor en los despejes de x, y y z , tenemos que el punto $\bar{x}_P$ que tiene como coordenadas

$$\left(x_0 - A \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2}, y_0 - B \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2}, z_0 - C \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2} \right)$$

es el único punto del plano P que satisface

$$\nabla f(\bar{x}_P) = \lambda \nabla g(\bar{x}_P)$$

donde λ está dada por (1). Ahora, note que

$$\begin{aligned}d(\bar{x}_0, P) &= \sqrt{f(\bar{x}_P)} \\&= \|\bar{x}_P - \bar{x}_0\| \\&= \left\| -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2}(A, B, C) \right\| \\&= \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.\end{aligned}$$

Lo que estábamos esperando.